

Jest to skuteczna metoda leczenia następujących schorzeń:

1. Przewlekła postać centralnej surowiczej chorioretinopatii (CSCR).
2. Wysiękowa postać zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD), przede wszystkim przy braku odpowiedniej reakcji na iniekcje doszklistkowe,
3. Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa (PCV).
4. Naczyniaki naczyniówki.

Procedura polega na podaniu dożylnym specjalnego kontrastu - Visudyny, który powoduje uwrażliwienie tkanki na działanie lasera. Następnie, po upływie 15 minut, wykonuje się naświetlenie laserem obszaru siatkówki, który chcemy poddać leczeniu przez czas 83 sekund.

Konieczne wyniki badań do kwalifikacji do zabiegu PDT:

1. SOCT.
 2. Angiografia fluoresceinowa (FA).
 3. Angiografia indocyjaninowa (jeżeli są trudności z dostępnością to wystarczy FA).
- Wszystkie badania można wykonać w naszej Klinice!

Przebieg zabiegu:

1. Pacjent nie musi być na czczo, ale nie należy spożywać obfitych posiłków przed zabiegiem.
2. Rozszerzenie źrenic, badanie okulistyczne ogólne, przegląd dokumentacji i aktualnych wyników.
3. Dożylnie podanie kontrastu (pompa) werteporfiny przez 10 minut.
4. Po kolejnych 1-5 minutach zabieg laserowy wykonywany przy lampie szczelinowej. Czas naświetlania siatkówki 83 sekundy. Maksymalnie 3 powtórzenia naświetlania.
5. **Ochrona przed światłem przez 48 godzin po zabiegu: wskazane noszenie długich rękawów i nogawek spodni oraz okularów przeciwsłonecznych – nadwrażliwość na światło.**

Kontrast – VISUDYNE, charakterystyka:

1. Wydalany z żółcią. Ciężka niewydolność wątroby jest przeciwwskazaniem do podania.
2. Wywołuje reakcje nadwrażliwości na światło w ciągu 48 godzin po podaniu.
3. Możliwe skutki uboczne :
 - Zaburzenia widzenia po samym zabiegu: mroczki, przymglenie widzenia, błyski.
 - Ból związany z wlewem (głównie ból pleców), nudności, nadwrażliwość na światło.
 - Poważne reakcje uczuleniowe – bardzo rzadko.

Kontrola po zabiegu:

Kontrola po PDT po 1 miesiącu i po 3 miesiącach (ważniejsza), wykonanie badania SOCT. Możliwość powtarzania terapii co 3 miesiące, ale liczymy na trwały efekt nawet po 1 zabiegu.